

## THE EFFECTIVENESS OF NUTRITIONAL EDUCATION BASED ON HEALTH BELIEF MODEL

## The Effectiveness of Educational Intervention based on the Health Belief Model on Eating Style and the Severity Reduction of Menstrual Pain among Clinical Personnel of the Imam Khomeini Hospital Complex

### ABSTRACT

**Background and objective:** Dysmenorrhea or painful menstruation can impair person's life. This study was aimed to determine the effectiveness of educational intervention based on health belief model (HBM) on eating style and to reduce the severity of the menstrual pain among clinical personnel in the Imam Khomeini Hospital Complex.

**Materials and methods:** In this intervention study, before and after the intervention, a random sampling and interviews were conducted, and finally 50 qualified female, with an average age of  $31.48 \pm 5.08$  (22-45 years), were selected to participate in the research. Data were collected through a researcher-made questionnaire based on the health belief model (HBM) and the validity was controlled by specialists and the reliability was assessed by Cronbach's alpha test ( $\alpha = 0.957$ ). Data was analyzed using SPSS 19 through descriptive and statistical paired t-test and ANOVA repeated measure test with a significant level of less than 0.05.

**Results:** Educational intervention increases the average rating in health belief structures among participants ( $p < 0.001$ ) but this increase did not take place in the guidelines for action structures ( $p = 0.39$ ).

**Conclusion:** To maintain and promote women's health is an educational priority. Nutritional education intervention promoted the nutritional behaviors and reduced dysmenorrhea among women examined. Therefore, with respect to efficacy and cost-effectiveness using it to reduce the initial dysmenorrhea is recommended.

**Paper Type:** Research Article.

**Keywords:** Health Belief Model (HBM), Eating style, Dysmenorrhea, Nutritional education intervention, Imam Khomeini Hospital Complex.

► **Citation:** Shakiba S, Shojaeizadeh D, Sadeghi R, Azam K. The effectiveness of educational intervention based on the health belief model on eating style and the severe reduction of menstrual pain among clinical personnel of the Imam Khomeini Hospital Complex. *Iran J Health Educ Health Promot.* Summer 2016;4(2): 158-168.

### Shila Shakiba

MSc. in Health Education and Health Promotion, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran mohandes\_shakiba@yahoo.com

### Davood Shojaeizadeh

Full Professor, Dept. of Health Education and Health Promotion, School of Public Health, TUMS, Tehran, Iran Shojae5@yahoo.com

### Roya Sadeghi

Associate Professor, Dept. of Health Education and Health Promotion, School of Public Health, TUMS, Tehran, Iran Sadeghir@tums.ac.ir

### Kamal Azam

\* Associate Professor, Dept. of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, TUMS, Tehran, Iran (Corresponding Author)  
Kazam@tums.ac.ir

**Received:** 16 October 2015

**Accepted:** 29 August 2016

## اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر اصلاح سبک تغذیه و کاهش شدت درد قاعده‌گی در کارکنان درمانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

شکیبا و همکاران / اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر اصلاح سبک تغذیه و کاهش شدت ...

### شکیبا

کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم

پزشکی تهران، تهران، ایران

mohandes\_i\_shakiba@yahoo.com

### داود شجاعی‌زاده

استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی

تهران، تهران، ایران

Shojae5@yahoo.com

### رؤیا صادقی

دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم

پزشکی تهران، تهران، ایران

Sadeghir@tums.ac.ir

### کمال اعظم

\* دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی

تهران، تهران، ایران (نویسنده مستنول)

Kazam@tums.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۷/۲۴  
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

### چکیده

**زمینه و هدف:** دیسمنوره یا قاعده‌گی دردناک می‌تواند زندگی فرد را دچار اختلال کند. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر اصلاح سبک تغذیه و کاهش شدت درد قاعده‌گی در کارکنان درمانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) انجام شد.

**مواد و روش‌ها:** در این پژوهش مداخله‌ای از نوع قبل و بعد، نمونه‌گیری بهصورت تصادفی و مصاحبه انجام شد و نهایتاً ۵۰ نفر زن واجد شرایط میانگین سنی  $31/48 \pm 5/0.8$  سال (جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی جمع‌آوری، روایی و پایابی آن بهوسیله متخصصان و آزمون آلفای کرونباخ  $\alpha = 0.957$  تائید شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ۱۹. آزمون‌های آماری توصیفی و تی-زوجی و آزمون تکرار مشاهدات در سطح معناداری کمتر از  $0.05$  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** مداخله آموزشی باعث افزایش میانگین امتیاز کسب شده در سازه‌های اعتقاد بهداشتی در افراد شرکت‌کننده شد ( $p < 0.001$ )؛ ولی در سازه راهنمای برای عمل، این افزایش صورت نگرفت ( $p = 0.39$ ).

**نتیجه‌گیری:** حفظ و ارتقای سلامت بانوان یک اولویت آموزشی است. مداخله آموزش تغذیه‌ای باعث ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای و کاهش قاعده‌گی دردناک در زنان موربدبررسی شد. لذا با توجه به کارایی و مقرن‌بهصره بودن، می‌توان استفاده از آن را برای کاهش دیسمنوره اولیه توصیه نمود.

**نوع مقاله:** مطالعه پژوهشی.

**کلیدواژه:** الگوی اعتقاد بهداشتی، سبک تغذیه، قاعده‌گی دردناک، مداخله آموزش تغذیه‌ای، مجتمع بیمارستانی امام خمینی.

◀ استاد: شکیبا ش، شجاعی‌زاده د، صادقی ر، اعظم ک. اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر اصلاح سبک تغذیه و کاهش شدت درد قاعده‌گی در کارکنان درمانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی. **فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت**. تابستان ۱۳۹۵(۲):۱۵۸-۱۶۸.

## مقدمه

نادسون (۱۵) در مطالعه‌ای نشان دادند زنان جوانی که از خوردن

صبحانه خودداری می‌کنند به طور معناداری بیش از زنانی که صبحانه می‌خورند، از قاعده‌گی دردناک رنج می‌برند.

مطالعات مختلف تأثیر تغذیه بر جنبه‌های مختلف سلامتی را به اثبات رسانده‌اند. از جمله به نتایج مطالعات توسلی و همکاران (۱۶) تحت عنوان «بررسی آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی و ارتقای مصرف میوه و سبزیجات برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی در سال ۲۰۱۳ و تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری کننده از بیماری‌های قلبی-عروقی در زنان خانه‌دار در سال ۲۰۱۰ توسط توسلی و همکاران (۱۷) انجام داد اشاره کرد. همچنین نتیجه مطالعاتی که دینی‌طلایه (۱۸) به بررسی آگاهی، باور و رفتار مصرف مواد غذایی در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی پرداختند و علیزاده‌سیوکی (۱۹) با بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه‌ای دانش آموزان مقطع ابتدایی تأثیر مثبت تغذیه بر جنبه‌های مختلف سلامتی را نشان دادند. منصوریان و همکاران (۲۰) نیز در مطالعه‌ای تأثیر آموزش سبک تغذیه می‌تواند باعث کاهش کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر شود.

مدت زیادی است که آموزش بهداشت نیز به عنوان رویکردی اثربخش برای توجه ویژه به موضوع پیشگیری در کلیه سطوح آن در کشورهای پیشرفته دنیا مؤثر واقع شده است. صاحب‌نظران برای پیشگویی و شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد، از الگوهای مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از الگوهای تغییر رفتار در آموزش بهداشت، الگوی اعتقاد بهداشتی است. این الگو بر اساس این اندیشه تدوین شده که آیا افراد با داشتن اعتقاد به وجود یک تهدید بهداشتی، رفتارهای خود را تغییر می‌دهند (۲۱). الگوی اعتقاد بهداشتی اگویی جامع است که بیشتر در پیشگیری (ثانویه) از بیماری نقش دارد تا کنترل آن (۲۲). کارایی الگوی اعتقاد

با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند و سلامت آن‌ها تضمین کننده سلامت کودکان و نیز ضامن سلامت خانواده‌هاست، هرگونه اقدام درمانی در دوره باروری زنان، سلامت آنان را در سراسر زندگی تضمین می‌کند و بدین ترتیب ضامن سلامت جامعه نیز خواهد شد (۱). دیسمبرور<sup>۱</sup> به معنای قاعده‌گی دردناک است که زندگی فرد را دچار اختلال می‌کند (۲). دیسمبرور اولیه، قاعده‌گی دردناک بدون علت پاتولوژیک است (۳). بیش از ۸۰٪ زنان قاعده‌گی دردناک دارند؛ به این علت نیمی از آنان در هرماه چند روز غیبت از محل کار و تحصیل دارند (۴). ابتلای مادر یا خواهر فرد به قاعده‌گی دردناک نیز احتمال ابتلای وی را افزایش می‌دهد (۵). همچنین به نظر می‌رسد که مشکلات قاعده‌گی در اکثر زنان بعد از یک بارداری فول ترم (کامل) بهبود می‌یابد (۶).

مطالعات مختلفی تأثیر گیاهان مختلف مانند ویتاگنوس، بابونه، زیره، آویشن و غیره را بر کاهش شدت قاعده‌گی دردناک به اثبات رساندند؛ که از بین آن‌ها می‌توان به مطالعه شوپیری و همکاران (۷)، داود و داودخان (۸)، مدرس و همکاران (۹)، عشیره (۱۰) و رجبی‌نائینی (۱۱) اشاره کرد. ضمن اینکه در طی یک مطالعه مداخله‌ای در آمریکا تأثیر ترکیب گیاهی شامل زیره سبز، آویشن و مریم‌گلی بر علایم قاعده‌گی بررسی شد و به این نتیجه رسید که ترکیب گیاهی فوق در درمان قاعده‌گی دردناک مؤثر است (۱۲). ذوروپ نیز در مطالعه‌ای به درمان‌های غیردارویی قاعده‌گی دردناک نظیر ویتامین ب۱، ویتامین ای و روغن ماهی پرداخت و آن را به ثبت رساند (۱۳).

از آنچاکه مطالعات نشان‌دهنده تأثیر مثبت رژیم غذایی بر قاعده‌گی دردناک نیز هست، شناخت اثرات رژیم غذایی بر این اختلال ضروری است و با توجه به اهمیت رژیم غذایی و اثرات طولانی‌مدتی که می‌تواند بر قاعده‌گی دردناک در زنان جوان به جا گذارد، مطالعاتی نیز در خصوص ارتباط بین عناصر غذایی و علایم شایع قاعده‌گی صورت گرفته است (۱۴). جیربایک و

1. Dysmenorrhea

توضیحات کامل تری ارائه می‌شد. به این طریق تعداد ۱۲۰ نفر در روزهای متوالی مورد مصاحبه قرار گرفتند؛ که از این تعداد ۵۰ نفر با میانگین سنی  $۰/۰۸ \pm ۰/۴۸$  (۳۱-۴۵ سال)، که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، وارد پژوهش شدند.

این مطالعه در کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد تائید قرار گرفت و گواهی آن با شماره IR.TUMS REC ۱۳۹۴, ۱۴۵۳.REC در تاریخ ۹۴/۹/۳۰ صادر شد. مطالعات قبلی نشان داده بود که تأثیر مداخله می‌تواند به میزان ۴۰٪ منجر به کاهش شدت قاعده‌گی دردناک در افراد شود ( $=P1/4$ ) (۲۷). لذا در این مطالعه می‌خواستیم میزان بهبودی و کاهش شدت دیسمنوره اولیه حداقل به سطح ۷۰٪ بررسد ( $=P2/7$ ) (۱۰). بنابراین، با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵٪ و حد اشتباه برآورد ۵٪ و با توان آزمون ۸۰٪ معنadar گردد، حداقل نمونه موردنیاز ۴۴ نفر برآورد شد و با احتمال ۱۰٪ ریزش در افراد موردمطالعه، درنهایت ۵۰ نفر موردمطالعه قبل و بعد قرار گرفتند.

اخذ اطلاعات از نفرات پس از دریافت رضایت‌نامه کتبی صورت گرفت. معیار ورود آزمودنی‌ها به مطالعه داشتن دیسمنوره اولیه از نوع متوسط تا شدید طبق جدول سیستم نمره‌گذاری چندبعدی-کلامی (۲۸)، نداشتن هیچ‌گونه عارضه‌ای مربوط به بیماری‌های زنان بنا به اظهار خود فرد و مصرف نکردن داروی ضدبارداری و معیار خروج آن‌ها از مطالعه نداشتن تمایل به ادامه همکاری و رعایت نکردن نکات تغذیه‌ای ارائه شده بود.

ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. این پرسشنامه از چهار بخش تشکیل شده بود: سؤالات جمعیت‌شناختی (۱۰ سؤال)، سؤالات مربوط به قاعده‌گی (۱۵ سؤال)، سؤالات مربوط به تغذیه (۱۳ سؤال) و سؤالات مربوط به الگوی اعتقاد بهداشتی (۲۹ سؤال؛ یعنی جمیعاً ۶۷ سؤال). تکمیل آن‌هم به روش مصاحبه بود.

روایی پرسشنامه با روش روایی محتوایی سنجیده شد. به این منظور، محتوای پرسشنامه با مطالعه کتب و مقالات علمی موجود تنظیم شد و سپس در اختیار ۱۰ تن از اعضای هیئت‌علمی و

بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری‌کننده در مطالعات مختلف و در بیماری‌های متفاوت مانند تب مالت (۲۳)، سلطان پستان (۲۴)، سلطان دهانه رحم (۲۵) و هپاتیت ب (۲۶) توسط پژوهشگران مختلف ثابت شده است. پژوهش حاضر نیز بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی طرح‌ریزی شده است که از سازه‌های حساسیت در کشیده، تهدید در کشیده، منافع در کشیده، راهنمایی برای عمل و خودکارآمدی تشکیل شده است.

مهم‌ترین جنبه نوآوری انجام این پژوهش به این دلایل بود: افزایش روزافزون درصد زنان شاغل در جامعه، شیوع بالای دیسمنوره اولیه و انجام نشدن مطالعه‌ای تا این زمان در زمینه ارزیابی تأثیر مداخله آموزش تغذیه‌ای بر ارتقای رفتار تغذیه‌ای و کاهش شدت درد قاعده‌گی و یافتن شدن رابطه به کارگیری الگویی مناسب و کارآمد در آموزش بهداشت در این رابطه. لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزش تغذیه‌ای بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر اصلاح سبک تغذیه و کاهش شدت درد قاعده‌گی در زنان کارکنان درمانی بیمارستان امام خمینی بود.

## مواد و روش‌ها

این پژوهش توصیفی-تحلیلی، مداخله‌ای و از نوع قبل و بعد بود. روش نمونه‌گیری بهصورت تصادفی و مصاحبه انجام شد. ابتدا بعد از مشخص شدن محیط پژوهش، در روزهای متوالی در محیط پژوهش انجام شد و نمونه‌ها از میان کارکنان درمانی شاغل در مجتمع درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) دارای شرایط شرکت در مطالعه انتخاب شدند. نحوه نمونه‌گیری به این صورت بود که ابتدا بعد از توضیح دادن دریاره موضوع پژوهش و اهداف پژوهش به شرکت‌کنندگان در پژوهش و در صورت تمایل آن‌ها به همکاری و داشتن سابقه قاعده‌گی دردناک و معیارهای اولیه ورود به پژوهش، فرم شماره ۱ (مقیاس نمره‌گذاری چند بعدی-کلامی) جهت تعیین درجه قاعده‌گی دردناک را پرکرده و سپس در صورت تشخیص قاعده‌گی دردناک درجه ۲ یا ۳، پرسشنامه‌ها توسط مصاحبه‌کننده تکمیل و در صورت وجود شرایط بودن افراد

قاعدگی تا روز پنجم قاعدگی فرد مورد بررسی در نظر گرفته شد. در طول ۳ ماه، سه جلسه آموزشی ماهانه در قالب گروههای چهار تا پنج نفره به صورت پرسش و پاسخ و پمفت و همچنین ۵-۶ تماس تلفنی و پیامک با واحدهای مورد پژوهش جهت یادآوری نکات توصیه شده و رفع ابهامات احتمالی برگزار شد. داده‌ها پس از جمع آوری، هر کدام از سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی با هم جمع شد و نمره هر بخش به طور مجزا محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از SPSS ۱۹، آزمون‌های آماری توصیفی و تی زوجی و آزمون تکرار مشاهدات در سطح معناداری کمتر از ۰/۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

### یافته‌ها

به علت پیگیری‌های متعدد و جلب همکاری و مشارکت افراد مورد بررسی هیچ گونه ریزشی در تعداد نمونه وجود نداشت. افراد در محدوده سنی بین ۴۵-۲۲ سال با میانگین سنی ۳۱/۴۸ سال و انحراف معیار ۰/۰۸ سال بودند و نمایه توده بدنه آن‌ها بین ۰/۸۶-۰/۱۶ با میانگین ۰/۵۰ و انحراف معیار ۰/۸۶ بود. اطلاعات مربوط به تحصیلات، وضعیت تأهل، سابقه زایمان و سابقه قاعدگی دردناک در فامیل درجه یک در جدول ۱ نشان داده شده است.

**جدول ۱. فراوانی و فراوانی نسبی زنان بررسی شده در مطالعه**

درصد فراوانی	فراوانی مطلق	سطوح وضعیت	وضعیت
۶	۳	دیپلم و کاردادی کارشناسی بالاتر از کارشناسی	تحصیلات
۸۶	۴۳		
۸	۴		
۴۸	۲۴	مجرد متأهل	وضعیت تأهل
۵۲	۲۶		
۳۰	۱۵	بلی	سابقه زایمان
۷۰	۳۵	خیر	
۸۰	۴۰	بلی	سابقه قاعدگی دردناک
۲۰	۱۰	خیر	در فامیل درجه ۱
۱۰۰	۵۰		جمع

دانشجویان دکترای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار داده شد و پس از کسب نظرات آنان و اصلاحاتی در آن، مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون مجدد به فاصله ۲ هفته استفاده شد. به این صورت که ۱۵ نفر از یک گروه درمانی بعد از تکمیل پرسشنامه، ۲ هفته بعد مجدداً همان پرسشنامه را تکمیل نمودند؛ که با اخذ ضریب همبستگی  $\alpha = 0/957$  پایایی آن تائید شد.

هر سازه ۵ سؤال بر اساس طیف استاندارد پنج گزینه‌ای لیکرت طراحی که حداکثر امتیاز ۲۵ و حداقل آن ۵ امتیاز بود تشکیل شده بود. نحوه امتیازدهی سوالات در هر سازه به این صورت بود: امتیاز ۱ = کاملاً مخالفم، ۲ = مخالفم، ۳ = نظری ندارم، ۴ = موافقم و ۵ = کاملاً موافقم. البته افزایش میانگین امتیاز سازه‌ها نشان‌دهنده بهبود سازه و تأثیر مداخله بود. برای سنجش «راهنما برای عمل» ۴ سؤال با طیف دو گزینه‌ای مطرح شد؛ که حداکثر امتیاز ۸ و حداقل آن ۴ امتیاز بود. به پاسخ بهله ۲ امتیاز و به پاسخ خیر امتیاز ۱ داده شد.

داده‌های پیش‌آزمون از طریق همان پرسشنامه جمع آوری و بعد از یک جلسه آموزشی و توجیهی در قالب گروههای چهار تا پنج نفره، برنامه مداخله آموزش تغذیه‌ای، که بعد از مشاوره با کارشناس تغذیه به صورت لوح فشرده آموزشی و پمفت تهیه شده بود، در اختیار افراد شرکت‌کننده قرار گرفت. مداخله تغذیه‌ای ارائه شده شامل محدودیت استفاده از گوشت قرمز (گوسفند، گوساله و یا گاو)، مواد غذایی سرخ شده، انواع نوشابه‌های گازدار، انواع شکلات، کاکائو و شیرینی‌جات (عسل و خرما به مقدار کم اشکالی نداشت)، فلفل، نمک فراوان، غذاهای پر ادویه و پر چاشنی (رب گوجه‌فرنگی، رب انار و غیره)، قهوه، نسکافه و چای پررنگ بود و در مقابل توصیه به استفاده بیشتر از گوشت سفید (مرغ، ماهی،...)، لبنیات (شیر، ماست،...)، تخم مرغ، سبزیجات تازه (سبزی‌های برگ سبز،...) میوه و آبمیوه طبیعی (پرتقال، گریپ‌فروت،...). نان سبوس‌دار، مغزها، جوانه‌ها و حبوبات بود. زمان رعایت این نکات از یک هفته مانده به تاریخ احتمالی

نتایج آزمون تی زوجی برای امتیازات سازه‌های مختلف الگوی اعتقاد بهداشتی، قبل و بعد از مداخله آموزشی حاکی از اختلاف معنادار نشد ( $p=0/39$ ) (جدول ۲).

**جدول ۲. نتایج توصیفی تحلیلی مقایسه میانگین نمرات و انحرافمعیار سازه‌های اعتقاد بهداشتی قبل و بعد از مداخله**

سطح معناداری	بعد از مداخله		قبل از مداخله		سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی
	انحرافمعیار	میانگین	انحرافمعیار	میانگین	
<0/001	۳/۷۱۵	۱۲/۵۸	۳/۴۳۹	۱۰/۶۴	حساسیت درکشده
<0/001	۳/۲۲۱	۱۲/۰۳	۳/۰۲۴	۱۰/۳۰	شدت درکشده
<0/001	۲/۶۸۳	۹/۹۴	۱/۸۸۸	۷/۷۸	منافع درکشده
<0/001	۳/۸۷۹	۱۳/۲۴	۳/۸۱۵	۱۱/۲۴	موانع درکشده
<0/001	۲/۷۷۰	۹/۶۰	۲/۰۰۹	۷/۹۲	خودکارآمدی
0/۳۹	۶۱۷	۴/۵۸	۰/۹۱۶	۴/۷۶	راهنمای عمل

کاهش مصرف گروه غذایی افزاینده شدت قاعده‌گی دردناک قبل و بعد از مداخله آموزشی نیز این آزمون اختلاف معنادار را نشان داد ( $p<0/001$ ) (جدول ۳).

در بررسی دریافت گروه‌های غذایی مؤثر بر کاهش شدت قاعده‌گی دردناک نتایج آزمون تی زوجی برای افزایش مصرف این گروه غذایی در افراد موردمطالعه، قبل و بعد از مداخله آموزشی حاکی از اختلاف معنادار بود ( $p<0/001$ ). برای

**جدول ۳. نتایج توصیفی تحلیلی مقایسه میانگین نمرات و انحرافمعیار مواد غذایی مؤثر بر قاعده‌گی دردناک قبل و بعد از مداخله**

سطح معناداری	بعد از مداخله		قبل از مداخله		متغیر
	انحرافمعیار	میانگین	انحرافمعیار	میانگین	
<0/001	۰/۳۹۸	۵/۸۱	۰/۷۹۲	۴/۳۶	۱- مواد غذایی مؤثر بر کاهش شدت قاعده‌گی دردناک
<0/001	۰/۸۷۶	۴/۷۸	۰/۹۲۵	۶/۰۹	۲- مواد غذایی مؤثر بر افزایش شدت قاعده‌گی دردناک

ساعت پس از شروع قاعده‌گی)، اختلاف معنادار قبل و بعد از مداخله آموزشی را نشان داد ( $p<0/001$ ) (جدول ۴).

در بررسی شدت درد قاعده‌گی، هدف از مداخله کاهش شدت درد بود. مقایسه میانگین و میانگین تکرار مشاهدات شدت درد در مقاطع زمانی (شروع قاعده‌گی، ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت و ۷۲ ساعت

**جدول ۴. نتایج توصیفی تحلیلی میانگین و مقایسه میانگین تکرار مشاهدات شدت درد قاعده‌گی قبل و بعد از مداخله آموزشی**

سطح معناداری	مقدار آماری	بعد از مداخله			قبل از مداخله میانگین (انحرافمعیار)	شدت درد میانگین (انحرافمعیار)
		سیکل سوم	سیکل دوم	سیکل اول		
		میانگین (انحرافمعیار)	میانگین (انحرافمعیار)	میانگین (انحرافمعیار)		
<0/001	۷۵/۸۵۸	۴/۳۸(۱/۹۰۵)	۵/۷۸(۲/۲۰۷)	۶/۸۲(۲/۵۶۹)	۷/۸۶(۲/۱۳۸)	شروع قاعده‌گی ۲۴ ساعت بعد
<0/001	۹۲/۸۶۳	۳/۹۸(۱/۷۴۴)	۵/۵۸(۲/۰۱۱)	۶/۶۲(۲/۳۰۳)	۷/۶۶(۱/۹۱۲)	۴۸ ساعت بعد
<0/001	۹۷/۰۵۴	۲/۷۶(۱/۶۲۳)	۴/۱۸(۱/۹۲۴)	۵/۳۶(۲/۲۸۴)	۶/۶۰(۲/۰۹۰)	۷۲ ساعت بعد
<0/001	۷۰/۲۳۰	۱/۵۸(۱/۵۵۳)	۲/۸۸(۲/۰۴۷)	۳/۸۶(۲/۳۹۱)	۴/۸۴(۲/۳۵۱)	

## بحث

همان‌طور که مشاهده می‌شود مقایسه جدول شماره ۳ و ۴ ارتباط بین اصلاح سبک تغذیه و کاهش درد قاعده‌گی را نشان می‌دهد.

روحی ناشی از قاعده‌گی دردناک تأثیر دارد و با دیگر ویتامین‌های گروه ب مانند نیاسین، اسیدفولیک، کوبالامین و غیره در اداره درد قاعده‌گی مؤثر هستند (۳۳). اخلاقی و همکاران (۳۴) نیز در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۹ بر روی ۲۲۰ زن انجام دادند، اثر ترکیبی از ۳۰۰ میلی‌گرم ویتامین ث و ۶۰ میلی‌گرم فلاونوئید در روز در تسکین دردهای قاعده‌گی را بررسی و نتیجه گرفتند که به میزان ۹۰٪ در کاهش درد قاعده‌گی مؤثر بوده است. ویتامین ای، به تنظیم هورمون‌های گردش خون در زمان قاعده‌گی کمک می‌کند؛ و مصرف مکمل ویتامین ای، به میزان ۴۰۰ واحد در روز باعث کاهش درد قاعده‌گی و همین‌طور رنجش عصبی، سردرد، خستگی، کم‌خوابی، تندرننس پستان‌ها، اضطراب و بی‌اشتهایی می‌شود (۳۵). استفاده روزانه ۱۲۰۰ میلی‌گرم کربنات کلسیم نیز در کاهش علایم قاعده‌گی دردناک مؤثر است (۳۶). نان و غلات سبوس‌دار، تخم مرغ، حبوبات (نخود و لوبيا، ...)، سویا، ماهی سالمون، ماهی آزاد، آجیل، بروکلی و موز سرشار از ویتامین ب و مرکبات و توت‌فرنگی، نیز سرشار از ویتامین ث هستند. مغزها، حبوبات، غلات سبوس‌دار، میوه‌ها و سبزی‌ها نیز منع ویتامین ای. هستند.

نتایج این مطالعات تأثیر تغذیه و مکمل‌ها را بر کاهش دردها و سایر علایم قاعده‌گی تائید می‌کنند؛ که با نتایج حاصل از مطالعه حاضر مبنی بر تأثیر مواد غذایی ذکر شده بر قاعده‌گی دردناک همخوانی دارد. این پژوهش‌ها تأثیر تغذیه را بر شدت دردهای قاعده‌گی اثبات می‌کنند.

در پژوهش حاضر سعی شد که تغییر عملکرد افراد در جهت اصلاح سبک تغذیه در اثر آموزش بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بررسی شود. بنابراین، حساسیت درک شده نسبت به دیسمنوره و عوارض آن مطرح شده، که هرچه بالاتر باشد، نشان‌دهنده بیشتر حساسیت فرد مورد بررسی نسبت به اهمیت قاعده‌گی دردناک و روش‌های کنترل آن است و هدف از انجام مداخله آموزشی نیز افزایش همین حساسیت بوده است. بر طبق جدول ۲، میانگین امتیاز کسب شده آزمودنی‌ها در سازه حساسیت درک شده از

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخله آموزش تغذیه مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در اصلاح سبک تغذیه و کاهش شدت درد قاعده‌گی در افراد شرکت‌کننده مؤثر بوده است. با توجه به عوارض داروهای شیمیایی، بسیاری از افراد مبتلا به دیسمنوره اولیه ترجیح می‌دادند از روش‌های غیرتهاجمی برای تسکین درد قاعده‌گی استفاده کنند.

از آنجاکه مطالعات نشان‌دهنده تأثیر مثبت رژیم غذایی بر قاعده‌گی دردناک است، شناخت اثرات رژیم غذایی بر این بیماری ضروری است. کیم و همکاران (۲۹) در مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۱ قطع الكل را در کاهش قاعده‌گی دردناک مفید دانست، رهبر و همکاران (۳۰) نیز در پژوهشی که در سال ۲۰۱۲ انجام شد، مصرف زیاد ماهی، تخم مرغ، بادام، پسته، میوه‌ها و سبزیجات، حبوبات، کلسیم، منیزیم و پروتئین را در رفع قاعده‌گی دردناک مؤثر دانست. جوناتان (۳۱) کاهش مصرف گوشت قرمز، شکلات و قهوه و افزایش مصرف غذاهای سبوس‌دار را در رفع دیسمنوره اولیه مؤثر دانسته است. مطالعات ذکر شده، نتیجه مطالعه حاضر مبنی بر اثر مصرف تخم مرغ، مغزها، ماهی، میوه، سبزیجات، حبوبات، غذاهای سبوس‌دار و لبنیات، که منع کلسیم هستند، در کاهش قاعده‌گی دردناک و مصرف گوشت قرمز، نمک، شکلات و قهوه بر افزایش قاعده‌گی دردناک را تائید می‌کند. مکمل‌های غذایی مانند ویتامین‌ها که بهوفور در مواد غذایی مختلف وجود دارند در اداره قاعده‌گی دردناک نقش دارند. ذاکری حمیدی و همکاران (۳۲) در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۶ انجام دادند کمبود ویتامین ب ۱ (تیامین) را با التهاب اعصاب لگنی و قاعده‌گی دردناک در ارتباط دانستند. کمبود ویتامین ب ۶ منجر به افزایش سطح پرولاکتین شده و در ایجاد ادم و علائم

۷/۷۸ به ۹/۹۴ افزایش یافت و آزمون تی زوجی نشان دهنده وجود اختلاف معنادار قبل و بعد از مداخله آموزشی بود. نتایج پژوهش حاضر با مطالعه سارانی (۳۸) مبنی بر اینکه آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی نقش مهمی در افزایش امتیاز سازه منافع درک شده شده در گروه موردبررسی دارد همخوانی داشت. منظور از موانع درک شده در این پژوهش، نگرش فرد به عواملی است که مانع انجام اصلاح سبک تغذیه خود می‌شود از جمله آگاهی نداشتن از مواد غذایی مناسب و هزینه بالای تهیه این مواد، مشکل بودن تهیه آن‌ها، در دسترس نبودن امکانات و ناهمانگی برنامه غذایی زنان با سایر اعضای خانواده خود. در مسیر رفتارهای بهداشتی موانعی از قبیل هزینه، زمان، امکانات لازم و درک و احساس ناتوانی برای رفتارهای توصیه شده وجود دارد که توسط شخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ممکن است منجر شود که فرد از رفتار مناسب و مطلوب خودداری کند. طبق جدول ۲ میانگین امتیاز سازه موانع درک شده از ۱۱/۲۴ به ۲۴/۱۳ افزایش یافت و آزمون تی زوجی نشان دهنده وجود اختلاف معنادار بود؛ که این تأثیر مثبت مداخله آموزشی را در افراد موردمطالعه در این سازه نشان می‌دهد.

منظور از خودکارآمدی در این پژوهش، توانایی ایجاد یک نتیجه دلخواه و درک و قضاؤت شخص در مورد توانایی انجام موفقیت‌آمیز یک عمل خاص است. گلانس و همکاران (۳۹)، خودکارآمدی را به معنای درک یا قضاؤت فرد در مورد توانایی انجام یک عمل خاص به‌طور موفقیت‌آمیز با کنترل عوامل پیرامون خود تعریف می‌کند. وکیلی و همکاران (۴۰) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی یکی از عوامل مهم در توان پیشگویی کنندگی قصد رفتار است. هر چه امتیاز خودکارآمدی افراد بالاتر باشد توانایی لازم برای پیگیری رفتار جهت اصلاح سبک تغذیه در مسیر کاهش شدت قاعده‌گی دردناک، بیشتر است. طبق جدول ۲ امتیاز سازه خودکارآمدی پس از مداخله آموزشی از ۷/۹۲ به ۶۰/۹ رسید. آزمون تی زوجی نیز نشان دهنده وجود اختلاف معنادار در زمینه مقایسه

۱۰/۵۸ به ۱۲/۵۸ رسید؛ یعنی در اثر مداخله آموزشی حساسیت درک شده افراد موردمطالعه به سطح مطلوبی رسید. آزمون تی زوجی نشان دهنده تفاوت معنادار در زمینه مقایسه میانگین حساسیت درک شده قبل و بعد از مداخله آموزشی بود. این مطالعه با مطالعه خلیلی و همکاران (۳۷) که در سال ۲۰۱۳ به بررسی اثربخشی آموزش بر باورهای بهداشتی و عملکرد زنان مراجعه کننده به درمانگاه شهید بهتاش منطقه لویزان تهران در زمینه روش‌های غربالگری سلطان پستان با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی پرداختند همخوانی داشت.

در این پژوهش شدت درک شده نسبت به جدی بودن قاعده‌گی دردناک و مشکلات و عواقب ناشی از آن مطرح شد؛ یعنی هر چه این میزان بالاتر باشد، بیانگر این امر است که فرد خطر مشکلات مربوط به آن را به طور جدی‌تری درک کرده است. هدف از انجام مداخله آموزشی در افراد موردمطالعه افزایش این شدت درک بود. طبق جدول ۲ میانگین امتیاز کسب شده در سازه شدت درک شده بعد از مداخله آموزشی از ۱۰/۳۰ به ۱۰/۰۳ رسید و آزمون تی زوجی نیز نشان دهنده وجود اختلاف معنادار در زمینه مقایسه میانگین شدت درک شده قبل و بعد از مداخله آموزشی بود. این یافته‌ها با نتایج مطالعات توسلی و همکاران (۱۶) و دینی‌طلاتپه (۱۸) همخوانی داشت. همچنین از مطالعه‌ای توسلی و همکاران در سال ۲۰۱۳ انجام دادند (۱۷) و مطالعه‌ای که علیزاده سیوکی (۱۹) جهت بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه‌ای داشت آموزان مقطع ابتدایی انجام داد، نیز نتایج تقریباً مشابهی با مطالعه حاضر به دست آمد.

منظور از منافع درک شده در این پژوهش نگرش فرد به منافعی است که کاهش قاعده‌گی دردناک و کنترل عوارض ناشی از آن برای او خواهد داشت. که هر چه امتیاز افراد بیشتر می‌بود، نشان دهنده درک بالاتر آن‌ها در رابطه با منافع پیشگیری یا کاهش قاعده‌گی دردناک و عوارض آن در جهت ارتقاء سلامتی آن‌ها بود. طبق جدول ۲ میانگین امتیاز سازه منافع درک شده از

دريافت اين مواد قبل و بعد از مداخله آموزشي بود؛ که نتيجه آن کاهش دردهای قاعده‌گی بعد از مداخله را نشان داد (جدول ۴).

در بررسی میزان رضایت از مداخله در پایان سیکل سوم، آزمودنی‌ها رضایت خود را از مداخله به صورت: ۲۶٪ کاملاً مؤثر، ۶۴٪ مؤثر و ۱۰٪ با تأثیر کم اعلام کردند. لازم به ذکر است که هیچ کدام از افراد شرکت‌کننده مداخله را بدون تأثیر ندانستند.

پژوهش حاضر با اتکا بر گفته آزمودنی‌ها در مورد سلامت خودشان، کاربرد صحیح و منظم و به موقع توصیه‌های غذایی و روش طبخ و ثبت شدت درد بود. با توجه به اینکه گزارش شدت درد و عوارض جانبی به کمک معیار سنجش درد و پرسشنامه توسط خود شرکت‌کننده‌ها گزارش می‌گردید؛ که می‌تواند محدودیت محسوب گردد. برای کاهش این محدودیت با استفاده از جدول سیستم نمره‌گذاری چند بعدی-کلامی در همان ابتدای کار خود به صورت مصاحبه فقط کسانی را وارد مطالعه شدند که شدت درد درجه ۲ یا ۳ داشتند. ضمن اینکه با دادن آموزش لازم به آزمودنی‌ها و پیگیری مرتباً آن‌ها و با در نظر گرفتن احتمال ریزش در تعیین حجم نمونه این محدودیت به‌طور نسبی کنترل شد.

به دلیل اینکه این تحقیق از نوع مداخله آموزش تغذیه‌ای بود و با توجه به نوع تحصیلات افراد مورد پژوهش (پزشکی و پیراپزشکی) و امکان سوگیری توسط واحدهای پژوهش، مداخله از نوع قبل و بعد انتخاب شد. نداشتن گروه شاهد یکی دیگر از محدودیت‌های مهم این پژوهش بود. البته حجم نمونه مطلوب وجود گروه شاهد از جمله نقاط قوت یک مطالعه است؛ لذا با توجه به شیوع بالای قاعده‌گی در دنیا و تأثیر رژیم غذایی بر شدت آن توصیه می‌گردد این مطالعه با تعداد نمونه بیشتر و همراه با گروه شاهد تکرار شود.

**نتیجه گیری:** با توجه به تمایل بیشتر افراد به استفاده از روش‌های غیرتهاجمی، به خصوص افرادی که در مصرف داروهای شیمیایی با عوارض دارویی رویه رو می‌شوند و یا تمایل به استفاده از مواد شیمیایی ندارند، این روش می‌تواند مفید باشد. لذا با توجه به کارایی و مقرن‌به‌صرفه بودن آن، می‌توان مداخله آموزش تغذیه‌ای

میانگین امتیاز سازه خودکارآمدی افراد مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله آموزشی بوده است. در مطالعه حسین نژاد و همکاران (۴۱) نیز نقش خودکارآمدی در پیش‌بینی رفتارهای غذایی دانش‌آموزان، ارتباط مثبت و معناداری را بین میانگین نمره رفتار غذایی و خودکارآمدی آن بر طبق رگرسیون دومتغیره نشان داد که با مطالعه حاضر همخوانی دارد.

همان‌طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود اختلاف معناداری در زمینه مقایسه میانگین امتیاز سازه راهنمای برای عمل در افراد مورد مطالعه، قبل و بعد از مداخله آموزشی وجود نداشت. پس در مورد این سازه می‌توان نتیجه گرفت که افراد هنوز به آموزش جهت استفاده بیشتر از منابع مختلف برای کسب اطلاعات بیشتر و افزایش آگاهی خود در مورد اصلاح سبک تغذیه و مشکلات مربوط به قاعده‌گی در دنیا و عوارض آن نیاز دارند.

به‌طور کلی، یافته‌های پژوهش حاضر تأیید کننده تأثیر مثبت برنامه آموزشی طراحی شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر افزایش میزان حساسیت در کشده، شدت در کشده، منافع در کشده و موانع در کشده و خودکارآمدی افراد شرکت‌کننده در مطالعه انجام شده بود؛ که با نتایج تحقیق توسلی و همکاران (۱۶-۱۷) و یافته‌های مطالعات آمیدو و همکاران (۴۲)، عبود و همکاران (۴۳) و کپینگ و همکاران (۴۴) همخوانی دارد. بر طبق جدول ۳ میانگین امتیاز کسب شده افراد مورد پژوهش در افزایش مصرف گروه غذایی ۱ (سبزیجات و ...) از ۴/۳۶ به ۵/۸۱ رسید؛ یعنی در اثر مداخله آموزشی، استفاده افراد مورد مطالعه از مواد غذایی مؤثر بر کاهش قاعده‌گی در دنیا به سطح مطلوبی رسیده است و آزمون تی زوجی نیز نشان‌دهنده تفاوت معنادار در زمینه مقایسه میانگین استفاده از این مواد قبل و بعد از مداخله آموزشی بود. همین‌طور میانگین امتیاز کسب شده افراد در کاهش مصرف مواد غذایی ۲ (شکلات، گوشت قرمز، ...)

از ۶/۰۹ به ۴/۷۸ رسید. یعنی در اثر مداخله آموزشی، استفاده افراد مورد مطالعه از این گروه غذایی کاهش یافت و آزمون تی زوجی نیز نشان‌دهنده تفاوت معنادار در زمینه مقایسه میانگین

بود. ضمن قدردانی و تشکر ویژه از استاد ارجمند و گرامی سرکار خانم دکتر آذرطبل به خاطر راهنمایی‌های عالمنه و بی‌دریغ ایشان، بدین‌وسیله از روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی، پزشکان، سرپرستاران و کارکنان پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و همچنین کلیه کسانی که در طراحی، اجرا و ارزشیابی این پژوهش ما را باری نمودند تقدیر و تشکر می‌گردد.

بر اساس این الگو را برای کاهش دیسمنوره اولیه و درمان این مشکل شایع زنان توصیه نمود.

## سپاسگزاری

این مقاله حاصل بخشی از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد (طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

### References:

- Sohrabi, Tadayyon, Javadifar. Comparison of the effect of acupressure at the point of San Jia00 and ibuprofen on primary dysmenorrhea. Ilam Univ; Med scie J.2006; 14(2):34. [Persian]
- Nahidi F, Bagheri L, Jannesari Sh. J midwifery and nursing. Under the title "The relationship between pregnant women with dysmenorrhea" 2007; 17(58). [Persian]
- Berek JS, Berek DL. Berek and Novak's Gynecology 15 th ed. In: Deborah L. Berek MA. editors. Text Book of Gynecology. London: Lippincott Williams & Wilkins. 2012:390-400.
- Durnell S.K. Likis F."Woman's gynecologic Health" 4th ed.2006:437
- Mishell D, Gookwin M, Brenner P."Management of common problems in obstetrics and gynecology" 4th ed.2002:237.
- Esperof. Clinical andocrinology of obstetrics and infertility.2005:471- 472.
- Shobeiri F, Mansouri Z, Araghchian M, 8 Nazai M. The comparative effect of herbal extract of vitagnus and mefenamic acid on primary dysmenorrhea. Zahedan J Med. 2012;14(5):30-33. [Persian]
- Dawood MY, Khan-Dawood FS. Clinical efficacy and differential inhibition of menstrual fluid prostaglandin F 2α in a randomized, double-blind, crossover treatment with placebo, acetaminophen, and ibuprofen in primary dysmenorrhea Am J Obstet Gynecol. 2007 Jan 31;196(1):35.e1–35.e5. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2006.06.091>
- Modares M, Mir mohamad Ali M, Ashrieh Z, Mehran A. Comparing the effects of mefenamic acid, Chamomile and capsule on primary dysmenorrhea. Babol Univ; J Med. 2011; 8(3):50-58. [Persian]
- Ashrieh Z. Comparison of the impact of mefenamic acid capsule and MC capsule on the severity of primary dysmenorrhea. School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences (TUMS). 2009:32-35,26-27. [Thesis].
- Rajabi Naiini M. The effect of brshdtt capsule on menstrual bleeding dysmenorrhea and cumin consumers IUD. Complementary Med. J. quarterly. 2013; (3). [Persian]
- Zoorob GK, inventor; Zoorob George K, assignee. Herbal preparation to relieve inflammation and smooth muscle contraction. United States patent US 8,226,987. 2012 Jul 24.
- Geri H. Managing primary dysmenorrhea. Pediatr Adolesc gyn Elsevier. 2006;19:342
- Fujiwara T. Diet during adolescence is a trigger for subsequent development of dysmenorrhea in young women. Int J Food Sci Nutr. 2007 Jan 1;58(6):437-444. <http://dx.doi.org/10.1080/09637480701288348>
- Fjerbæk A, Knudsen UB. Endometriosis, dysmenorrhea and diet, what is the evidence? Eur J Obst Gyn Reprod Biol 2007; 132(2): 140–147.
- Tavasoli E, Reiesi M, Javad zadeh H, Mazaheri M, Gharli pour Z, Ghasemi S, Shakoori S. The effect of the health belief model-based education & improvement of consumption of fruits and vegetables, An interventional study. J. In the field of health care quarterly-Shahid beheshti Univ; Med Sciences-Faculty of health. 2013;1(2):29-35. [Persian]
- Tavasoli E, Hasanzadeh A, Ghiasvand R, Tol A, Shojaei Zadeh D. Training impact based on Health Belief Model on preventive promotion of nutritional behaviors of cardiovascular disease in women housewife in Isfahan. J. the Faculty of health and Health Research Ins. 2010;8(3): 23-11. [Persian]
- Dini Talatappéh H. Knowledge, Beliefs and Behavior of Food Consumption among Students of Military Univ; The Application of Health Belief Model (HBM). Ir. J. Military Med. 2012;14(3). [Persian]
- Alizadeh Siuki H. Effects of Health Education Based on Health Belief Model on Nutrition Behaviors of Primary School Students in Torbat e Heydariyeh City in 2012, J. Health and hygiene. 2014;5(4):289-299. [Persian]
- Mansourian M, shafieyan Z, Qorbani M, Rahimzadeh Bazraki H, Charkazi R, Asayesh H, Rezapoor A, Rastgari mehr B. Effect of nutritional education based on HBM model on anemia in Golestan girl guidance school students. 2013
- Robert T, Croyle. Theory at a glance: A guide for health promotion practice, U.S. Dep. health and human services. Natio. Ins. Health 2005:16-17.

22. Shojaei Zadeh D. Models of Behavior in a study of health education of the Department of communication and health education, the Health Department, the Ministry of health, treatment and Med education.1ed 2000:29. [Persian]
23. Karimy M. Montazeri A. Araban M.The effect of an educational program based on Health Belief Model on the empowerment of rural women in prevention of brucellosis. AMUJ; 2012;14(4):85-94. [Persian]
24. Karimy M. Hasani M. Khorram R. Gafari M. Niknami SH.The effect of education, based on Health Belief Model on breast self examination in the Health volunteer in Zarandieh. Tabibe Shargh J Zahedan Univ Med Scie. 2008;10(4):79-87. [Persian]
25. Karimy M. Gallali M. Niknami SH. Aminshokravi F. Tavafian SS.The effect of Health Education based on Health Belief Model on performance of Pap smear test among women referring to health care centers in Zarandieh J Jahrom Univ Med Scie.2012;10(1):47-53. [Persian]
26. Wai CT. Wong ML. Ng S. and et al.Utility of Health Belief Model in predicting compliance of screening in patients with chronic hepatitis B. Aliment Pharmacol Ther.2005;21(10):1255-1262.
27. Safari A, Shah Rezaei Gh, Damavandi A. Comparison of the effects of vitamin E and mefenamic acid on the severity of primary dysmenorrheal. J Army Univ Med Sci I.R. Iran 2006;4(13):735-8. [Persian]
28. Anderech and Milson L. An epidemiologic study of young woman with dysmenothea.Am J Obs Gyn. 2003;144: 659.
29. KimY. Lee M,Yang Hur.Self aromatherapy massage of the abdomen for the reduction of menstrual pain and anxiety during menstruation in nurse: A placebo-controlled clinical trial.Eur J Integrative Med. 2011;3(3): 165-168.
30. Rahbar N. Asgharzadeh N.Ghorbani R.Effect of omega-3 fatty acids on intensity of primary dysmenorrheal.Intern J Gyn Obst. 2012;117: 45-47
31. Jonathan (Burke and Jonathan).Women's diseases, Burke and Novak. 2005:275.
32. Zakeri Hamidi S. Ziae M. Kazemnejad A.The therapeutic effect of vitamin E on gastrointestinal symptoms associated with primary dysmenorrhea. Ardabil Univ Med Scie J. 2006; 6(4):374-378.
33. Douglass.Premenstrual syndrome.Canadian Family Physician,2002.Ford O. Lethaby A,Roberts H. Mol B.W. Progesterone for premenstrual syndrome.Cochrane Database Syst Rev.2012;3:CD003415.
34. Akhlagy F.Zirak N.Nazemian Sh. The effect of vitamin E in the treatment of primary dysmenorrhea. J the Faculty of nursing and midwifery, Teh Unive Med Scie. life. 2009; 15(1): 19-13.
35. Abassinia K. KHeirkhah M.Jahdi F.Aghahosseini F.Hassani M.The effect of perforan on thi mood symptoms of premenstrual sundrome. J. Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2013; 1(3).
36. Rapkin,Adapted from the dissertation for obtaining the master's degree title: Comparing the impact of massage therapy with fragrances and fragrance without the brshed primary dysmenorrhea.2003. (bliss Hosseini M.) 2014; 48 ][http://healthjournal.arums.ac.ir/browse.php?a\\_id=26&sid=1&slc\\_lang=fa](http://healthjournal.arums.ac.ir/browse.php?a_id=26&sid=1&slc_lang=fa)
37. Khalili S. The impact of education on knowledge, attitude, practice of women referring to Lavizan district of Tehran Shahid behtash clinic for breast screening on health belief model (HBM). 2013:18-19
38. Sarani M. The Study for Health Belief Model efficiency in adopting preventive behaviors in the Sistan region tuberculosis patients 2009-2010. Med Scie and Health Services Zahedan: Sch Pub Health. 2011;1:152. [Thesis].
39. Glans k. Rimer B.Viswanath k.Jea TJ.Behavior and Health Education;Theory,Research and practice.4ed Wiley John and Sons, I.corporate.2008; (47).
40. Vakili M, Hidarnia A, Niknami S, Mousavinasab S. Effect of communication skills training on health belief model constructs about AIDS in Zanjan health volunteers (2010-11). ZUMS Journal. 2011;19(77):78-93.Abstract/FREE Full Text
41. Hossein nejad M, Aziz ZadehForozi M,Mohamadalizadh S, et al. The role of self -efficacy in predict eating behaviors among high school girl student Kerman. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Siccences, Yazd. 2008;16(3):49-56
42. Amodeo R, De Ponti A, Sorbara L, Avanzini F, Di Giulio P, De Martini M. How to increase patient knowledge of their coronary heart disease: Impact of an educational meeting led by nurses. G Ital Cardiol. 2009; 10(4): 256.258.
43. Abood D, Black DR, Feral D. Nutrition education worksite intervention for university staff: application of the health belief model. Nutr Educ Behav 2003; 35(5):260-67.
44. Kipping Ruth R, Russell Jago b, Debbie A. Lawlor. Diet outcomes of a pilot school-based randomised controlled obesity prevention study with 9–10 year olds in England. Preventive Medicine 2010; 51: 56–62.